


## Odlingsinstruktion

Version 2010 - 01

- \* Mycket god smak
- \* Koktyp fast
- \* Vacker skalfinish
- \* Många knölar
- \* Stor skörd



## Karaktärsdrag

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Koktyp:                       | A=Fast                                     |
| Egenskap:                     | Medeltidig                                 |
| Skördegenskap:                | Hög  |
| Knölstorlek:                  | Medel                                      |
| Knölform:                     | Lång-oval                                  |
| Antal knölar:                 | 12-14                                      |
| Köttfärg:                     | Mörkgul, efter kokning                     |
| Skalfärg:                     | Gul  |
| Bär:                          | Inga bär                                   |
| Groningsperiod:               | Kort                                       |
| Uppkomst:                     | Snabb                                      |
| Sencorkänslig:                | Känslig                                    |
| Blastutveckling:              | Medel                                      |
| Stötkänslig:                  | Inte känslig                               |
| Åldersknölstörning:           | Inte känslig                               |
| Torrsubstans procent:         | 18,4                                       |
| TS halt:                      | 1072                                       |
| Potatis cystnematodresistens: | Resistent: Ro1,2/3,4,5<br>Känslig mot: Pa2 |
| Kräftresistent:               | Resistent: fysio 1<br>Känslig mot: fysio 2 |
| Rostkänslighet:               | Något känslig                              |
| Bladmögel:                    | Väldigt känslig                            |
| Brunröta:                     | Väldigt känslig                            |
| Vanlig skorv:                 | Känslig                                    |
| Pulverskorv:                  | Känslig                                    |
| PVYn-virus:                   | Resistent                                  |
| Yntn knöltolerans:            | Känslig                                    |

## Plantering

Marknad: 35-55 mm.  
Planteringsdjup:  
Tidig skörd: Normalt djup  
Sen skörd: 2-3 cm djupare än normalt.  
Radavstånd: 75 cm.

28/35 - ungefär 60000 plantor/ha - ± 21 cm.  
32/40 - ungefär 48000 plantor/ha - ± 28 cm.  
40/50 - ungefär 40000 plantor/ha - ± 33 cm.

Kontrollera alltid antalet knölar för en noggrann beräkning.

## Gödsling

Följ jordanalyser för att få en god skörd. Annabelle behöver jämn gödsling. Kväve ca. 120% i jämförelse med andra medeltidiga utsäden. Minska kvävetillskottet under den sista delen av groningsperioden för att få bäst kokkvalité och se till att potatisen får god möjlighet till vila. En omfattande fosfor gödsling före plantering ger ett bättre rotsystem och en starkare planta. Gödsla med Kalium beroende på jordanalysen.

## Odlingsinstruktion

### Förbehandling och plantering



Förbehandling och plantering:

- Annabelle har kort vila.
- Håll utsädet under kylld lagring för att minska risken för fysiologiskt åldrande och uttorkning av utsädet.
- Låt utsädet anpassa sig till de lokala förhållandena innan det planteras.
- Plantera utsädet när små vita groddar syns för bästa resultat.
- Plantera 3 cm djupare än normalt för att hjälpa rotsystemet finna mer näring.
- Behandla alltid utsäde mot Rhizoctonia.

Klyvning av utsäde:

- Klyvning av utsäde kan göras vid stora storlekar men gör det enbart under torra förhållanden.
- Låt utsädet läka direkt efter klyvning. För bästa resultat klyv utsädet 3-4 veckor innan plantering.

### Viktiga delar under växtperiod



- Efter uppkomst använd Sencor i små mängder.
- Låt blasten växa tills knölnarna nått 45 mm i storlek.
- Övergödsling bör bara ges i små kvantiteter.
- Övergödning kommer resultera i högre känslighet för mögel.
- Behandla tidigt mot mögel (Phytophthora).
- Under den andra delen av växtperioden, låt plantan mogna naturligt. Detta för att motverka att knölnarna sätts i vila och det minskar också känsligheten för stress hos utsädet.
- Konstbevattning ger en normal växtlighet och en enhetlig produkt med god kokkvalité.


### Skörd



- För optimal vila bör blasten kapas när potatisen är mogen.
- Sikta på att få en produkt med en torrsustans på 19,7%.
- Vänta minst 3 veckor mellan kapning av blast och skörd för bästa skalmognad.
- Utsädets skal skall vara helt moget innan man skördar.
- Undvika att skada utsädet vid skörd till varje pris.
- Mek. skador kommer leda till uttorkning och tidig groning hos utsädet.

## Odlingsinstruktion

### Lagring



- På grund av den korta vilan och känsligheten mot fusarium bör man vara extra uppmärksam under lagring.
- Om skörd skett under normala förhållanden kan kylning påbörjas väldigt kort tid efter inlagring.
- För lagring längre än 2 månader måste kylning användas.

#### Kyld lagring:

- Förhindra uttorkning: Kyl med små skillnader mellan temperaturer.
- Sänk temperaturen med 0,5-0,7°C per dag tills du når 5°C.
- Lagringstemperaturer lägre än den rekommenderade kommer leda till ökad svettning hos utsädet.
- Ventilera regelbundet under korta stunder för att förhindra CO<sub>2</sub> bildning.
- Förändringar i temperaturen tillsammans med kondensation resulterar i tidig groning och ökad risk för silverskorv.