


## Odlingsinstruktion

Version 2010 - 01

- \* Tidig till medium tidig
- \* Mörkgult kött
- \* Väldigt ljust och jämt skal
- \* Jämn storlek hos knölar
- \* Omtyckt smak



## Karaktärsdrag

Koktyp:	B=något mjölig
Egenskap:	Tidig
Skördegenskap:	Medel
Knölstorlek:	Stor
Knölform:	Oval / Lång-oval
Antal knölar:	12-14
Köttfärg:	Gul, efter kokning
Skalfärg:	Gul
Bär:	Inga bär
Groningsperiod:	Medel
Uppkomst:	Snabb
Sencorkänslig:	Känslig
Blastutveckling:	Stark
Stötkänslig:	Något känslig
Åldersknölstörning:	Något känslig
Torrsubstans procent:	20,0
Ts halt:	1079
Potatis cystnematodresistens:	Resistent: Ro1,4 Något känslig mot: Ro2/3 Känslig mot: Ro5
Kräftresistent:	Resistent: fysio 1 Känslig mot: fysio 2
Bladmögel:	Väldigt Känslig
Brunröta:	Resistent
Vanlig skorv:	Något känslig
Pulverskorv:	Känslig
PVYn-virus:	Resistent
Yntn knöltolerans:	Något känslig

## Plantering

Storlek: 40-65 mm.  
Radavstånd: 75 cm.

28/35 - ungefär 56000 plantor/ha 24 cm 1500 kg.  
35/45 - ungefär 48000 plantor/ha 28 cm 2600 kg.  
45/50 - ungefär 42000 plantor/ha 32 cm 3600 kg.  
50/55 - ungefär 36000 plantor/ha 37 cm 3900 kg.

Kontrollera alltid antalet knölar för en noggrann beräkning. För sen skörd kan utsädet placeras 20% närmare än vanligt.

## Gödsling

För önskad storlek 40-65 mm. Tidig produktion.

Gödsla för ett moget bladverk när blasten kapas. Total kvävedos kan vara den samma som för andra tidiga sorter. En riktlinje kan vara ungefär 200 kg kväve inklusive det som redan finns i jorden. Använd bara naturligt gödsel om kvävenivån är låg. För starkare blastutveckling är det rekommenderat att lägga till en extra dos av flytande magnesium tillsammans med bladmögemedel. Använd bara kalium som vårgödsel 6 veckor innan plantering. Sen applikation kan minska undervattenvikten.

## Odlingsinstruktion

### Förbehandling och plantering



- Saline har god gröningsvila.
- Förgroning är inte nödvändig, men ger en bra start för utsädet.
- Groddarna utvecklas starkt hos denna sort.

### Viktiga delar under växtperiod



- Använd helst Sencor endast före uppkomst eller i låg dos.
- Vädret spelar stor roll för effekten; anpassa dosen efter väderförhållandet.
- Konstbevattning har en positiv effekt på den växande skörden och ger en jämn slutprodukt.
- Var försiktig när det gäller Alternaria som utsädet är något känslig emot.

### Skörd



- Vänta till knölnarna har mognat, generellt tar detta 3 veckor efter att blasten har kapats.
- För tidig skörd kommer ha negativ effekt på lagringsegenskaperna hos potatisen. Har skörden skett med försiktighet kommer man inte stöta på några problem.
- Direkt efter skörd skall potatisen ventileras i 3 dagar före det tvättas och packeteras.
- För längre förvaring, en god skalmognad är första steget till bra kvalitet.

### Lagring



- Utsädet har god vila, men är något känslig mot Phoma och Fusarium.
- Lagra med försiktighet under torkningsprocessen, tillåt en period för skalsättning innan kylning.
- Kylning och torkning är mest effektiv med 0,5-1°C per dag.
- För snabb kylning utan en bra skalmognad ökar risken för Phoma. Risken för stötskador ökar också markant.
- Ventilera regelbundet för att undvika CO<sub>2</sub> och kondensations bildning.