


Odlingsinstruktion

Version 2010 - 01

- * Ger tidig skörd
- * Jämn storlek hos knölar
- * Ljust skal
- * Stora knölar



Karaktärsdrag

Koktyp:	AB=något fast
Egenskap:	Tidig
Skördegenskap:	Medel hög
Knölstorlek:	Väldigt stor
Knölform:	Oval
Antal knölar:	6-8
Köttfärg:	Gul, efter kokning
Skalfärg:	Gul
Bär:	Få antal
Groningsperiod:	Medel
Uppkomst:	Normal
Sencorkänslig:	Känslig
Blastutveckling:	Medel
Stötkänslig:	Medel känslig
Äldersknölstörning:	Känslig
Torrsubstans procent:	17,4
TS halt:	1067
Potatis cystnematodresistens:	Resistent: Ro1,2/3,4 Känslig mot: Ro5
Kräftresistent:	Resistent: fysio 1 Känslig mot: fysio 2
Rostkänslighet:	Något känslig
Bladmögel:	Känslig
Brunnröta:	Något känslig
Vanlig skorv:	Något känslig
Pulverskorv:	Något känslig
PVYn-virus:	Väldigt känslig
Yntn knöltolerans:	Något känslig

Plantering

Storlek: 40-65 mm.
Planteringsdjup: 3-4 cm djupare än normalt.

Radavstånd: 75 cm.

28/35 - ungefär 74000 plantor/ha - ± 18 cm.
35/50 - ungefär 56000 plantor/ha - ± 24 cm.
50/55 - ungefär 44000 plantor/ha - ± 30 cm.

Kontrollera alltid antalet knölar för en noggrann beräkning.

Gödsling

Följ jordanalyser för att få en god skörd. Kväve (N): ungefär 120% i jämförelse mot andra tidiga typer. Applicering: 4/5 före plantering, 1/5 direkt efter knölarne har börjat växa. Kontrollera att vatten och näring finns i reglerade mängder för att minska risken för sprickor. Om knölarne inte skulle växa under en period kan det leda till sprickor. Carrera är känslig för mineralunderskott, gödsla därför med micronäring. Mangan och magnesium ger större bladverk och förhindrar för tidig åldring av utsädet. Förutom detta bör man applicera bor på känslig jord.

Odlingsinstruktion

Förbehandling och plantering



- Carrera har medellång vila.
- Om betydande förgroning har skett, ta bort groddarna och plantera utsädet med mindre avstånd.
- För att få en så hög kvalitet på produkten som möjligt applicera ett betningsmedel för att undvika RHIZOCTONIA.
- Bygg upp raderna noga för att undvika gröna potatisar.

Viktiga delar under växtperiod



- Bästa resultat erhålls i rik och tung jord med god struktur.
- Blast utvecklingen är medelstor därför är en hög kvävedos viktig direkt vid plantering.
- För att få kraftigt och rik blast läs mer på sida 1 kapitel: Gödning.
- Användandet av Sencor rekommenderas före uppkomst, efter uppkomst bör det enbart användas i små doser.
- Vädret spelar stor roll för effekten; anpassa dosen efter väderförhållandet.
- Konstbevattning ger bra skörd med jämn produkt och bättre kokkvalité.
- Börja tidigt med arbete för att förhindra Alternaria.
- Phytophora besprutning:
 - Riklig Phytophora besprutning är nödvändig på grund av känslighet hos blasten.

Skörd



- Generellt har Carrera jämn storleksfördelning.
- Undvik mek. skador genom att minska fallhöjden.

Lagring



- Carrera är en tidig sort och bör därför säljas inom 5 månader efter skörd.
- En skörd under goda förhållanden kan bli kyld snabbt efter inlagring.
- För förvaring längre än 3 månader krävs kylning.
- Förhindra uttorkning: Kyl med små skillnader mellan temperaturer.
- Sänk temperaturen med 0,5-0,7°C per dag tills du når 5°C.
- Lagringstemperaturer lägre än den rekommenderade kommer leda till ökad svettning hos utsädet.
- Ventilera regelbundet under korta stunder för att förhindra CO₂ bildning.
- Förändringar i temperaturen tillsammans med kondensation ger ökad risk för groning och silverskorv.