


Odlingsinstruktion

Version 2010 - 01

- * Tidig skörd
- * Starka groddar
- * Ljust skal
- * Stor skörd
- * Tidig skalmognad



Karaktärsdrag

Koktyp:	AB=något fast
Egenskap:	Tidig
Skördegenskap:	God
Knölstorlek:	Medel
Knölform:	Oval
Antal knölar:	15-17
Köttfärg:	Gul, efter kokning
Skalfärg:	Gul
Bär:	Inga bär
Groningsperiod:	Lång
Uppkomst:	Snabb
Sencorkänslig:	Inte känslig
Blastutveckling:	Stark
Stötkänslig:	Känslig
Åldersknölstörning:	Känslig
Torrsubstans procent:	19,2
TS halt:	1075
Potatis cystnematodresistens:	Resistent: Ro1,4 Något känslig mot: Ro5 Känslig mot: Ro2/3
Kräftresistent:	Resistent: fysio 1,2
Rostkänslighet:	Resistent
Bladmögel:	Känslig
Brunnröta:	Något känslig
Vanlig skorv:	Något känslig
Pulverskorv:	Känslig
PVYn-virus:	Något känslig
Yntn knöltolerans:	Resistent

Plantering

Storlek: 40-65 mm. (Jämförbar med Berber)

Radavstånd: 75 cm.

28/35 - ungefär 56000 plantor/ha - 24 cm.

35/45 - ungefär 48000 plantor/ha - 28 cm.

45/50 - ungefär 42000 plantor/ha - 32 cm.

50/55 - ca. 36000 plantor/ha - 37 cm.

Kontrollera alltid antalet knölar för en noggrann beräkning. För sen leverans kan utsädet planteras upp till 20% närmare varandra.

Gödsling

Vid önskad storlek 40-65 mm, tidig groning. Justera gödningen för ett moget bladverk före blastkapning.

Total kväve-dos är standard för de tidiga sorterna. Som riktlinje kan man ta ungefär 200 kg kväve inklusive det som redan finns i jorden under en applicering. Applicera gödsel via micronäring om plantering skett sent. Ge enbart naturlig gödning efter plantering om kväve mängden är begränsad. För en starkare planta rekommenderar vi att man ger extra magnesium (flytande) före blomning. Vid plantering i jord med låg kalium halt ge näring med extra kalium.

Odlingsinstruktion

Förbehandling och plantering



- Ingrid är lämplig att plantera i lätt till medeltung jord.
- I tung jord med dålig struktur finns en risk för dåliga knölar.
- Förgroning ger Ingrid en god start i växt processen.
- Ingrid kan planteras på normalt planteringsdjup, utsädet är inte känsligt för gröna knölar.

Viktiga delar under växtperiod




- Under normala omständigheter reagerar Ingrid bra på användning av Sencor.
- Ingrid är känslig mot bladmögel och därför måste man vara extra uppmärksam under blastutveckling.
- Variera typerna av medel och byt senare över till systemiska medel.

Skörd



- För optimal vila skall blasten kapas hos en mogen planta.
- Optimal kokkvalité nås när Ingrid har en undervattenvikt av 330-360 gram.
- Undvik skador hos utsädet under skörd och lagring.
- 100% skalmognad ger bäst konsumtionskvalité.
- Under grön skörd, eller snabb skörd efter blastkapning torka utsädet fort och kyl ner det för att behålla bästa kvalité.

Lagring



- Ingrid har god groningsvila.
- Om hög undervattenvikt (>360 gram) kan potatisen transporteras för längre sträckor.